

外来化学療法連携充実に係る薬剤部マニュアル

1) 当院薬剤部による外来化学療法服薬指導に関する運用

- ① 外来にて新規に S-1 またはゼローダ@(カペシタビン)が開始となる患者、または当該内服のアドヒアランスの不安がある患者が対象となる。
- ② 対象の患者は薬剤部にて初回開始時等は外来にて服薬指導を行う。
- ③ 服薬指導の対象患者情報については前日までに外来から薬剤部へ連絡を行う。
- ④ 当院薬剤部による外来化学療法服薬指導では文書管理にある「S-1・カペシタビンを内服される方へ」(以後、A)と「【特定薬剤管理指導加算 2】服薬情報提供書 (トレーシングレポート)」(以後、B)を使用する。
- ⑤ 指導薬剤師は文書管理にある A の指導箋を使用し、服薬指導を行い、指導箋はこの際に本人へ A と B をお渡しし、B をかかりつけの保険薬局へ提出するように説明する。
- ⑥ 薬剤部では保険薬局より B にて報告にあった事例の内容に関してはある程度精査し、今後の地区薬剤師会との事例検討などに活用する。

2) 保険薬局からの服薬情報提供書の運用

- ① 保険薬局では B を持参した患者の服薬指導に関しては、服薬状況確認のために、服用開始 3 日目に患者宅へ電話にて服薬状況を確認し、B を記載の上、米沢市立病院地域連携室宛に F A X (0238-22-2624) にて報告する。
- ② B の運用として他には、外来化学療法をしているその他の患者において、主治医に緊急な疑義紹介ではない報告事項がある場合は B を記載し、米沢市立病院地域連携室宛に F A X にて報告する。
- ③ 地域連携室では B の報告があった場合は電子カルテの取り込みファイルとして取り込みを行う。原本は薬剤部にて保管管理とする。

S1・カペシタピンを内服される方へ

様

スケジュール

週服用

週休薬

飲み方: 1日2回 朝・夕食後

1回: 朝食後

錠

夕食後

錠

の

朝食後

より開始

	日	月	火	水	木	金	土
日付							
朝	錠	錠	錠	錠	錠	錠	錠
夕	錠	錠	錠	錠	錠	錠	錠
日付							
朝	錠	錠	錠	錠	錠	錠	錠
夕	錠	錠	錠	錠	錠	錠	錠
日付							
朝	錠	錠	錠	錠	錠	錠	錠
夕	錠	錠	錠	錠	錠	錠	錠
日付							
朝	錠	錠	錠	錠	錠	錠	錠
夕	錠	錠	錠	錠	錠	錠	錠

- 飲み忘れた時は、飲み忘れた分を飲まずに次の分から飲んでください。
- 絶対に2回分を一度に飲まないでください。薬の副作用が強く出ることがあります。
- 飲んだか飲まなかったかわからなくなったときは、念のため飲まないでください。
- 間違えて多く飲んだ時は、すぐ病院に連絡してください。